

PPP OMOLOGATE ÎN ROMÂNIA PENTRU CULTURA DE TOMATE

FUNGICIDE

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	ALLSTAR 250 SC	Phytophthora infestans (Mana tomatelor), Alternaria spp. (Alternarioza)	0,75-1,0 L/ha (in functie de gradul de infestare)
2.	AZUMO WG	Fainarea	2,0 kg/ha
3.	BOTECTOR	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	1,0 kg/ha
4.	BOUILLIE BORDELAISE WDG	Pseudomonas tomato (patarea pustulara), Alternaria solani (alternarioza), Phytophthora infestans (mana), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,75% (7,5 kg/ha)
5.	CABRIO TOP	Mana, fainarea, patarea alba, patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha
6.	CALIZI / (SINPRO - a doua denumire comerciala)	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha
7.	CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)	Mana solanaceelor, patarea bruna	0,15% (1,5 kg/ha)
8.	CARIAL STAR	Mana, alternarioza	0,6 l/ha pentru culturi în câmp și spații protejate
9.	CASINO ROYALE	Alternaria spp. (Alternarioza)	1,5 Kg/ha
10.	CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%)
11.	CUPROFIX ULTRA / NOVICURE-a doua denumire comerciala	Mana, alternarioza, putregaiul radacinilor și fructelor, basicarea fructelor, patarea pustulara	1,6-2,4 kg/ha
12.	CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)	Mana, Mana Mana	3,0-4,0 l/ha 5,3 l/ha pentru culturi în spații protejate 53 ml/100 mp pentru culturi în spații protejate
13.	CURENOX 50	Phytophthora infestans (mana tomatelor), Alternaria solani (alternarioza)	1,5-2,0 kg/ha
14.	DAGONIS	Fainarea Alternarioza, patarea cafenie Fainarea Alternarioza	0,6 L/ha 1,0 L/ha 0,6 L/ha 1,0 L/ha
15.	DIFCOR 250 EC	Alternarioza, putregaiul cenușiu, putregaiul	0,5 l/ha

		alb	
16.	EQUATION PRO	Phytophthora infestans (mana tomatelor), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,4 kg/ha
17.	FLOSUL	Fainarea	2,0 L/ha
18.	FLOWBRIX / (COPPER-FIELD - a doua denumire comerciala)	Mana, agenti patogeni bacterieni	2,6 ml/10 mp
		Mana, agenti patogeni bacterien	2.5 l/ha
19.	FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)	Mana tomatelor	0,15%
		Caderea rasadurilor	0,15%(4-5 sol./mp)
		Mana tomatelor	0,15%(4-5 sol./mp)
		Rizoctonioza	0,15%(4-5 sol./mp)
20.	KOCIDE 2000	Mana, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%)
21.	LIETO / (ZETANIL - a doua denumire comerciala)	Mana	0,40 kg/ha
22.	MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)
23.	ORIOUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala)	Alternarioza	0,05% (0,5 L/ha in 1000 L apa)
24.	POLYRAM DF	Patarea cafenie a tomatelor, alternarioza, mana tomatelor, patarea alba a frunzelor de tomate	0,2%
25.	PROPLANT 72,2 SL	Mana de sol a tomatelor	0,15-0,25% (3-5 l sol./m2)
		Mana tomatelor	0,15-0,25% (1,5-2,5 l/ha)
		Căderea plăntuțelor	0,15-0,25% (3-5 l sol./m2)
26.	PYRUS 400 SC / (PAPYRUS 400 SC - a doua denumire comerciala)	Putregaiul cenușiu	0,15% (1,5 l/ha)
27.	REFLECT	Fainarea	1,0 l/ha se aplica la culturi in sere si solarii
28.	SCALA	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	2,0 L/ha
29.	SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)	Alternarioza (patarea bruna)	0,5 L/ha
30.	SIGNUM / (SYREX STAR -doua denumire comerciala)	Putregaiul cenușiu, fainarea	1,5 kg/ha
31.	SULBARI	Leveillula taurica (fainarea)	5,0 kg/ha
32.	SWITCH 62,5 WG	Putregaiul cenușiu	0,8-1,0 kg/ha
33.	VINCARE 51,7 WG	Mana tomatelor	1,6-2,0 kg/ha
34.	ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala)	Phytophthora infestans (Mana tomatelor)	3,75-5,0 kg/ha
		Alternaria solani (Alternarioza)	3,75-5,0 kg/ha
35.	DOMARK 10 EC	Fainarea	0,4 L/ha (0,04%)

36.	REVUS 250 SC	Mana tomatelor	0,6 l/ha
		Phytophthora infestans (mana tomatelor)	0,6 L/ha
37.	VITRA 50 WP / (CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha
38.	CYCLO-R LIQUIDO	Mana tomatelor	2,4-4,0 l/ha
39.	KANTAREL	Fainarea (sera)	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)
40.	OMIX / (EDEGAL - a doua denumire comerciala)	Mana, caderea plantutelor	300 mL/ m ³ /substrat
		Mana, caderea plantutelor	5-6 mL/mp
41.	COPFORCE EXTRA / (CUPMAN - a doua denumire comerciala)	Mana, alternarioza	2,0 kg/ha
42.	CUPERTINE SUPER / (COMBIDUO COBRE - a doua denumire comerciala)	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha
		Mana tomatelor	3,5 kg/ha
43.	TAEGRO	Mana tomatelor	0,37 kg/ha
		Mana tomatelor, fainarea, patarea bruna a frunzelor de tomate (alternarioza)	0,37 kg/ha
44.	THIOVIT JET 80 WG	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha
45.	ARMETIL COBRE / (MANOXIN COMBI-a doua denumire comerciala)	Mana tomatelor	2,5 kg/ha
46.	REVUS 250 SC	Mana tomatelor	0,6 l/ha
		Phytophthora infestans (mana tomatelor)	0,6 L/ha
47.	LUNA PRIVILEGE 500 SC	Putregaiul cenusiu	0,5 l/ha (0,05%)
48.	LUNA SENSATION 500 SC	Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu)	0,6 L/ha
49.	FYTOSAVE	Leveillula taurica (Fainare)	2,0 L/ha
50.	LEGADO / (DIAGONAL - a doua denumire comerciala)	Fainarea	0,8 l/ha
51.	EVALIA / (TAZER - a doua denumire comerciala)	Mana, fainarea, alternarioza	0,05-0,08% (50-80 ml/100 l apa)
52.	PREVICUR ENERGY	Mana, caderea plantutelor, spatii protejate	3 L/ha tratament aplicat prin picurare
		Mana, caderea plantutelor, spatii protejate	3 mL/mp tratament aplicat la sol
53.	SERENADE ASO	Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu), Pseudomonas syringae (patarea pustulara a fructelor), Xanthomonas spp. (patarea bacteriana a frunzelor)	4,0-8,0 L/ha
		Fusarium oxysporum (fusarioza)	10,0 L/ha
54.	TELDOR 500 SC	Putregaiul cenusiu, spatii protejate	0,8 L/ha

55.	TRIUMF 40 WG	Mana, spatii protejate	2,0-2,5 kg/ha
56.	BASAMID GRANULE	Mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara	500 kg/ha
57.	SONATA	Leveillula taurica (fainarea), Oidium lycopersici (fainarea)	5,0-10,0 L/ha
58.	T34 BIOCONTROL	Caderea plantelor	0,5 g/mp de substrat pana la 5 cm adancime
		Caderea plantelor	0,01 g/l sol sau substrat sau 0,005g/l+0,005 g/l
		Caderea plantelor	10 g/ m ³ de substrat

INSECTICIDE

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	AFFIRM	Minierul frunzelor de tomate, omida fructelor	1,5 kg/ha
2.	AVAUNT 150 EC	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha în câmp și spații protejate)
3.	BELTHIRUL	Omizile fructelor	0,25-0,50 kg/ha (800-1000 l apa/ha)
4.	COLUMBO 0,8 MG	Viermii sarma, buha sematurilor	12 kg/ha
5.	CORAGEN	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha
6.	COROCID SUPER	Coropisnita	20 kg/ha
7.	ERCOLE	Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestit al radacinilor	10-15 kg/ha
8.	FLORAMITE 240 SC	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha
9.	FURY GEO	Viermii sarma	12-15 kg/ha
10.	LEBRON 0,5 G	Viermii sarma, buha sematurilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha
11.	MICROSED GEO / (SOBEK UP - a doua denumire comerciala)	Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp. (buha), Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Ceutorhynchus pleurostigma (gargarita), Blaniulus guttulatus (sarpele orb, miriapod), Hylemya spp. (muste), Chamaepsila rosae (musca morcovului), Tipula spp. (țânțari)	16-20 kg/ha se aplica prin incorporare la semanat sau transplantare
12.	PLINTO 2,5 EC / (ALFASURE 2,5 EC - a doua denumire comerciala)	Omida fructelor, buha gama	0,4-0,6 l/ha
13.	POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)	Afide, tripsi, musculita alba de seara	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)
14.	TRIKA EXPERT	Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestit al radacinilor	10-15 kg/ha
15.	ALVERDE	Omida fructificațiilor, larve L1-L3	0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa)

16.	SIVANTO PRIME 200 SL	Afide (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>); Musculițe (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,56 L/ha
17.	VOLIAM TARGO	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha
18.	GRIAL / (DIEDRO - a doua denumire comerciala)	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)
19.	VERTIMEC PRO	Păianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha
20.	MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)	Tripsul californian	0,04%
21.	FASTER 10 CE	Păduchele verde	0,02% (0,2 l/ha)
22.	VYDATE 10 L	Nematozi (nematodul tulpinilor si bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, <i>Pratylenchus</i> , <i>Tylenchulus</i>) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide, musculita tutunului, paduchele verde al piersicului, tripsul tutunului)	10 L/ha,câmp
		Nematodul galicol al radacinilor, musculita alba de sera, musca minieră a solanaceelor	10 L/ha, sera si solarii
23.	VYDATE 10 G	Musulita alba de sera, nematozii galicoli, nematodul tulpinilor	30,0-55,0 kg/ha, câmp, sera si solarii
24.	LIMOCIDE	<i>Thrips tabaci</i>	4,0 L/ha,sere
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Musculita alba de sera)	2,0 L/ha ,sere
25.	FLIPPER	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha, câmp
		Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha, spații protejate)
26.	APACHE / (VERTAB - a doua denumire comerciala)	Musca miniera,seră	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel
		Musca miniera, câmp	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl)
		Acarianul rosu comun, acarianul lat, câmp	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl)
27.	AZATIN EC	Afide, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Leptinotarsa decemlineata</i> , <i>Liriomyza</i> spp., Noctuide (<i>Trichoplusia ni</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Spodoptera exigua</i>), Tripsi, <i>Tuta absoluta</i>	1,0 - 1,5 L /ha, sere Se aplică la avertizare.
28.	BACTOSPEINE DF / (DIPEL DF - a doua denumire comerciala)	Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha , sere
29.	BERMECTINE	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere
		Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL), sere
		Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere
		Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100

			mL/hL) , câmp
30.	PREV GOLD	Acarieni (<i>Tetranychus urticae</i>), Musculita alba (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,4-0,8% (maxim 8 L/ha)
31.	SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inlforitului.
32.	HARPUN	Musculita alba de sera	75 ml/100 L apa , solarii
33.	JUVINAL 10 EC	Musculita alba de sera	0,05% , solarii
34.	DELTAM	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 mp
		Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 mp
35.	MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)	<i>Helicoverpa armigera</i> (Omida fructelor), <i>Macrosiphon euphorbiae</i> (Paduchele verde al solanaceelor)	0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apa)
36.	VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua dnumire comeziala)	Omida capsulelor (larve L1 - L2)	0,02 % (0,2 l p.c. /ha)
37.	VERTIMEC 1,8% EC	Acarieni	60 mL/hl , câmp
		Musca miniera	60-80 mL/hl , sera
		Acarieni, tripsul californian, musca miniera, trpsul comun, acarieni galicoli,	60-80 mL/hl , spații protejate
38.	LASER 240 SC	Musca miniera a solanaceelor	0,05%
39.	SANIUM SYSTEM	Afide (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>); <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (<i>Musculita alba de sera</i>)	4,5 L/ha , sere și solarii
40.	MINECTO ALPHA	Tripsul californian, musculita alba de sera, omizi defoliatoare, omida fructelor, musca miniera, molia tomatelor	1,0-1,25 L/ha (1,0 L/ha-irigare prin picurare sau 1,25 L/ha-pulverizare)
41.	NOFLY WP	Musculita alba de sera	200-250 g/hl
42.	REQUIEM PRIME	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului, tripsul californian, acarianul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha
43.	SANMITE 10 SC	Paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha
44.	SPRUZIT	<i>Aphis gossypii</i> , <i>Aulacorthum solani</i> (Afide)	6,0 L/ha in 600 L apa (talie plantei <50 cm)
		<i>Aphis gossypii</i> , <i>Aulacorthum solani</i> (Afide)	9,0 L/ha in 900 L apa (talie plantei 50-125 cm)
		<i>Aphis gossypii</i> , <i>Aulacorthum solani</i> (Afide)	12,0 L/ha in 1200 L apa (talie plantei >125 cm)
45.	CYPERGUARD 25 EC / (FOSTOC - a doua denumire comerciala)	Paduchele solanaceelor, gandacul din Colorado	0,008%
46.	DELMUR	<i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ,	500 mL/ha

		Myzus persicae ,Helicoverpa armigera , Spodoptera sp.,Spodoptera exigua , Spodoptera littoralis, Agrotis segetum, Heliothis sp., Chrysodeixis calcite, Autographa gamma, Tuta absoluta.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ACARICIDE

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	NISSORUN 10 WP	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha
2.	KANEMITE SC	Paianjenul rosu comun	In spatii protejate 1,25 L/ha in 1200 L apa
3.	MOVENTO 100 SC	Tetranychus urticae (Acarianul roșu comun)	0,75 L/ha
4.	VERTIGO 018 EC	Acarianul stacojiu	0,05 %

ERBICIDE

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	BUZZIN	Buruieni dicotiledonate si unele monocotiledonate	0,50 kg/ha aplicat la plantare
2.	MATECOR EXPRESS	Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili	0,4 kg/ha Se aplica pretransplantare
		Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili	0,4-0,75 kg/ha Se aplica post rasarire si post-transplantare ,stadiul de 8-9 frunze(BBCH 18-19)
3.	SHARPEN 40 SC / (PENDISOL 40 SC - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate	3,3-4,1 l/ha se aplica preemergent cu 2-3 zile inainte de plantare
4.	STOMP AQUA / (PROWL AQUA - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	1,0-3,0 l/ha inaintea transplantarii
5.	STRATOS ULTRA / (FOCUS - a doua denumire)	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (aplicat singur) Postemergent

	comerciala)	Buruieni monocotiledonate perene	2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent
		Buruieni monocotiledonate anuale	1-2 L/ha (aplicat singur) Postemergent
		Buruieni monocotiledonate anuale	2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent
6.	TARGA MAX / (GRAMIN MAX - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale	0,4-0,6 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Shorgum halepense pana la 15-25 cm, Agropyron repens sub 20 cm
		Buruieni monocotiledonate perene	0,6-1,25 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Shorgum halepense pana la 15-25 cm, Agropyron repens sub 20 cm
7.	WISH TOP / (QUICK FORTE - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale si perene	0,83-1,25 L/ha
8.	SENCOR LIQUID 600 SC	Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,45 l/ha Preemergent Tomate semanate
		Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,35 l/ha Postemergent (la minim 40 de zile de la tratamentul in preemergență. Tomate semanate
		Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,6 l/ha Preemergent, Tomate transplantate
9.	FUSILADE FORTE	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha Tomate semanate direct in camp
		Buruieni monocotiledonate perene	1,0 l/ha Tomate semanate direct in camp
		Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha postemergent Tomate transplantate
		Buruieni monocotiledonate perene	1,3 l/ha postemergent Tomate transplantate
10.	DEVIRINOL 45 F	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate	3,0-4,0 L/ha se aplica inainte de semanat cu incorporare Tomate semanate direct in camp
11.	DUAL GOLD 960 EC / (TENDER-a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic)	1,0 l/ha Preemergent Tomate in camp (cultura infiintata prin rasad)

12.	METOS 960 EC	Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate (Setaria, Galinsoga)	1,0 L/ha Se aplica preemergent Tomate transpl., tomate semănate direct in camp.
13.	AGIL 100 EC / (ZETROLA - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha ,postemergent Tomate transplantate
		Costrei din rizomi	1,0 L/ha ,postemergent Tomate transplantate
14.	METRIPHAR 70 WG	Buruieni dicotiledonate `si unele monocotiledonate	0,3 kg/ha Tomate transplantate
15.	PANTERA 40 EC / (RANGO - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale	0,75 l/ha postemergent Tomate transplantate
16.	TARGA SUPER 5 EC	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 l/ha postemergent Tomate transplantate
17.	TITUS 25 DF / (TAROT - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotiledonate	40-60 g/ha +Trend90, 0,1 % surfactant Postemergent Se aplica primăvara de la prima frunză până la prima inflorescență a culturii (BBCH 11-51)

REGULATORI DE CREȘTERE

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	ATONIK	Obținerea de spor de producție	0,5 l/ha Se aplica de la apariția primelor inflorescențe până la apariția primelor fructe (BBCH 51-71)
2.	SmartFresh ProTabs	Regulator de creștere	0,084 g/ m ³ - se aplica nu mai târziu de 24 de ore, după recoltare
3.	PLANTLINE E4	Combaterea maturizării neuniforme	0,0125 L/m ³ Se aplica la sfârșitul ciclului de producție, timp de 6 săptămâni, noaptea, prin fumigare. Tomate spații protejate

NEMATOCIDE , TRATAMENT SOL

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	AFROMYL	Nematozi	10,0 L/ha Se aplica la plantare / transplantare
2.	BASAMID GRANULE	Nematodul galicol al radacinilor	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de plantare
3.	NEMATHORIN 10 G	Nematodul galicol al radacinilor	15 kg/ha Tomate sera si solarii
4.	NEMASOL 510	Patogeni, nematozi, buruieni	700 L/ha -se aplica inainte de plantarea rasadurilor Tomate sera
5.	TERVIGO	Nematozii galicoli	5,0 L/ha Tomate spatii protejate
6.	VELUM PRIME 400 SC	Meloidogyne sp. (Nematozi), Leveillula taurica (Fainare)	625 mL/ha Tomate sera si solarii
7.	VYDATE 10 L	Nematozi (nematodul tulpinilor si bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, Pratylenchus, Tylenculus) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide, musculita tutunului, paduchele verde al piersicului, tripsul tutunului)	10 L/ha
		Nematodul galicol al radacinilor, musculita alba de sera, musca minieră a solanaceelor	10 L/ha Tomate sera si solarii

Rodenticide, Moluscocide

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	IRONMAX PRO	Limași	7,0 kg/ha Tomate seră
2.	AGROSAN B	Melcii fără cochilie	15 kg/ha(administrare pe sol, fără incorporare) Tomate in camp
3.	SLUXX HP	Melci fără cochilie (limacși); Melci cu cochilie	7,0 kg/ha Se aplică uniform pe sol, la începutul infestării.
4.	ARVALIN	Șoarecele de câmp	5 bucăți/galerie